


Como evitar la contaminación con residuos antibióticos en los tanques de leche.

Aquí presentamos **NUEVE ERRORES** que pueden contaminar tu tanque de leche con residuos antibióticos. Aprenda nuestros TIPS y recomendaciones para evitar cada uno de ellos.




INCORRECTO: Ordeñar las vacas después de ser tratadas con antibióticos.

CORRECTO: Siempre **ordeñe las vacas tratadas** al final y desinfecte la unidad de ordeño entre cada vaca.




INCORRECTO: Si un cuarto de la ubre es tratado su leche debe ser descartada y la leche de los otros tres cuartos puede ser incorporada al tanque de leche.

CORRECTO: Descartar la leche de **todos los cuartos** cuando la vaca es tratada sistémicamente.



INCORRECTO: Una vaca tratada se confunde con una vaca no tratada, y la leche se dirige a la línea de leche.

CORRECTO: Establecer un **protocolo de identificación para las vacas tratadas**. Antes de ser tratadas colocar al menos dos identificaciones visuales diferentes. Algunas opciones son bandas en las patas, marcas con crayón, cintas en la cola o cadena en el cuello. La identificación debe ser segura pero de fácil remoción cuando el tiempo de retiro del antibiótico se haya cumplido.



INCORRECTO: Una vaca seca con tratamiento se ordeña por error y la leche se envía al tanque de almacenamiento.

CORRECTO: **Separar las vacas secas tratadas** de las vacas lactantes, de preferencia en corrales aislados.




CORRECTO: Todas las vacas tratadas se ordeñan al final. Es la manera como se debe hacer y desviar la línea de leche del tanque de almacenamiento.

IDEAL: Desarrolle un **protocolo para asegurar que la leche se desvíe**. Coloque una lista con las vacas tratadas en la línea de ordeño y evite que su leche llegue al tanque de almacenamiento.


1. Después de ordeñar vacas no tratadas, retire las unidades de ordeño y prepárelas para los animales tratados.
2. Separe la línea de ordeño del tanque de almacenamiento de leche y revise la lista de vacas tratadas para verificar que todos los animales tratados hayan sido descartados del tanque de almacenamiento.

6

Sin tratamiento




Tratada



INCORRECTO: El vacío de la línea de leche se usa para operar cubos de leche de descarte.

CORRECTO: Siempre ordeñe las vacas tratadas después de las vacas no tratadas. **La eliminación frecuente de leche contaminada** de los cubos de descarte también reduce potencialmente la contaminación de la línea de leche.

7



INCORRECTO: La compra de vacas lactantes tratadas son ordeñadas y la leche se dirige al tanque de almacenamiento.

CORRECTO: Siempre **pruebe las vacas lactantes recién compradas** antes de agregar su leche al tanque de almacenamiento.


8



INCORRECTO: La alimentación medicada se mezcla accidentalmente con la alimentación de vacas lactantes.

CORRECTO: Los alimentos medicados **no deben usarse con vacas lecheras lactantes**. Si se usan alimentos medicados para animales no lactantes, almacene los alimentos en una instalación separada de los alimentos para vacas lactantes

9



INCORRECTO: Aunque haya transcurrido el tiempo de retiro adecuado, los residuos de medicamentos todavía están presentes en la leche de una vaca tratada.

CORRECTO: **Todas las vacas retienen residuos de drogas por diferentes períodos de tiempo**. La edad de la vaca, el tipo de antibiótico y si el tratamiento fue "etiqueta adicional" afectan el tiempo de retiro. Antes de permitir que la leche de una vaca tratada entre al tanque de almacenamiento, siempre pruebe la leche. Se requiere un resultado negativo.

Evitar estos errores comunes puede ayudarlo a entregar alimentos seguros y saludables para el consumidor.

Para más información,
contacte a su representante IDEXX.

tel: +55 11 3095-5632 | comercial-latam@idexx.com | al.idexx.com

Test with Confidence™

